

缓解肩部、颈部、腰部的强烈痛感

# フェイスZ<sup>α</sup> ディクサス<sup>®</sup> ゲル

## Feitas<sup>®</sup> Z<sup>α</sup> Dicsas<sup>®</sup> Gel (微香型)

含双氯芬酸钠1.0%凝胶剂

### 商品的特点

- 有效成分双氯芬酸钠对缓解肩部、腰部、关节、肌肉的疼痛问题表现出良好效果。
- 本品采用了带有清凉感的酒精凝胶基质，方便推开且迅速变干。
- 微香型处方不会产生让人不快的气味，使用时无需担心气味对他人的影响。
- 乳白色凝胶触感温和，不刺激皮肤。

### ⚠ [使用上的注意事项]

**⊗ 禁止事项** [如不遵守，将会导致目前症状恶化或易引起不良反应。]

- 下列人群请勿使用。
  - 对本品或本品成分有过敏史的人。
  - 有哮喘病史的人。
  - 孕妇或可能已怀孕的妇女。
  - 不满15岁的儿童。
- 请勿用于以下部位。
  - 眼周、粘膜等。
  - 皮肤敏感脆弱的部位（面部、头部、腋下等）
  - 湿疹、接触性皮炎、伤口。
  - 足癣、皮癣等或化脓的患部。
- 使用本品期间，请勿使用其他外用镇痛消炎药。
- 请勿长期连续使用。



### 諮詢事項

- 下列人群请在使用前諮詢医生、药剂师或注册经销商。
  - 正在接受医生治疗的人。
  - 有对药物等过敏史的人。
  - 正在使用下列药品的人。  
新喹诺酮类抗菌药
- 使用后出现下列症状时，因为有可能是药物副作用，所以请立即停止使用，并持本说明书諮詢医生、药剂师或注册经销商。

相关部位	症状
皮肤	发疹与发红、瘙痒、接触性皮炎、肿胀、疼痛、皮肤皸裂、刺激感、色素沉着、水疱疹、皮肤掉屑（皮肤上有细屑脱落）

极少数患者会出现下列严重症状。此时请立即接受医生的诊疗。

症状名称	症状
休克 (过敏性反应)	使用后立即出现皮肤瘙痒、荨麻疹、声音沙哑、打喷嚏、喉咙发痒、呼吸困难、心悸、意识模糊等症状。
接触性皮炎 光线过敏症	涂抹部出现伴有强烈瘙痒的发疹与发红、肿胀、刺激感、水疱、溃烂等剧烈的皮炎症状及色素沉着、白斑，其中发疹与发红、瘙痒等症状有时会遍及全身。另外，暴露在阳光下的部位有时会出现症状或症状加重。

- 若使用5~6天后症状仍无好转，请停止使用，并持本说明书諮詢医生、药剂师或注册经销商。

**【功能、效果】**腰痛、肌肉疼痛、伴随肩酸的肩膀疼痛、关节痛、腱鞘炎（手、手腕疼痛）、手肘疼痛（网球肘等）、挫伤、扭伤

**【用法、用量】**每天3~4次，取适量涂抹于患处。但是，请勿用保鲜膜等透气性较差的物品覆盖于涂抹部位。此外，请勿同时使用含有本成分的其他外用药剂。

（用法与用量相关的注意事项）

- （1）未满15岁的儿童请勿使用本品。
- （2）请严格遵守规定的用法和用量。
- （3）本品不能治疗引发疼痛和肿胀等症状的疾病，而是治疗疼痛和肿胀等症状的药剂，因此仅限于出现症状时使用。
- （4）请注意不要溅入眼睛。万一不慎入眼，请立即用清水或者温水冲洗。此外，如果症状严重，请接受眼科医生的诊疗。
- （5）本品仅限外用。
- （6）1周使用量请勿超过50g。
- （7）使用本品的部位请勿同时使用其他外用药剂。
- （8）请勿使用透气性较差的物品（保鲜膜、矫正带等）覆盖使用本品的部位，不得让患处处于密封状态。
- （9）使用后请洗手。

**【成分、分量】**

成分	含量(膏体100g中)
双氯芬酸钠	1.0g
ℓ-薄荷醇	4.5g
甘草次酸	0.05g
壬酸香兰基酰胺	0.02g

添加剂中含有乙醇、二乙醇胺、疏水性羟丙甲纤维素、辣椒酊、BHT、羟丙基纤维素、丙二醇、脂肪醇聚氧乙烯醚及其他3种成分。

#### **保管及使用注意事项**

- （1）请保管在阴凉处，避免阳光直射。
- （2）请将本品放在儿童接触不到的地方。
- （3）请勿换装到其他容器中（可能造成误用或者变质）。
- （4）请勿靠近火源。
- （5）请注意避免让本品沾染到眼镜、钟表、饰物等金属类、化纤类衣物、塑料类产品、地板及家具涂层表面，否则存在导致物品变质或变色的风险。
- （6）本品过期后请勿使用。

#### **严禁烟火**

第二石油类 危险等级III 乙醇含有物 水溶性

**【包装】** 50g