

缓解每日难受的身体疼痛

# サロンパス® EX インドメタシン 3.5%

## Salonpas® EX 吲哚美辛 3.5%

〈淡香型〉外用镇痛消炎贴剂

### 产品特点

- 添加3.5%吲哚美辛，消炎镇痛效果优异。
- 採用彈性材質，服貼舒適質地柔軟，不易產生藥布疹。
- 尺寸精巧，適合貼於肩頸僵硬的相關部位（肩膀、頸部下方、肩胛骨附近）。
- 散發淡淡香氣，可安心使用。

### ⚠ [ 使用注意事项 ]

**⊗ 禁止事項** [ 如果違反本項規定，可能會使症狀惡化，或引發副作用。 ]

- 有以下情況者，請勿使用本產品。
  - (1) 曾因使用本產品或本產品成分而出現藥物過敏等過敏反應者。
  - (2) 有氣喘病者。
  - (3) 11歲以下兒童。
- 請勿將本品用於下述部位。
  - (1) 眼睛周圍、黏膜等。
  - (2) 濕疹、皮膚炎、傷口。
  - (3) 香港腳、金錢癬或化膿的患部。
- 請勿連續使用本產品超過兩週。

### 👨‍⚕ 用藥諮詢

- 有以下情況者，使用前請諮詢醫師意見，或洽詢藥劑師或零售藥房。
  - (1) 正在接受醫師治療者。
  - (2) 孕婦或可能已懷孕的女性。
  - (3) 曾出現藥物過敏等過敏反應者。
- 如使用後出現下列症狀，可能是本產品引發的副作用，請立刻停止使用，並持本包裝盒諮詢醫師意見，或洽詢藥劑師或零售藥房。

作用部位	症狀
皮膚	起疹發紅、腫脹、瘙癢、刺痛、灼熱感、乾燥、皮膚炎

- 使用5~6天後，如症狀仍未好轉，請停止使用，並持本包裝盒諮詢醫師意見，或洽詢藥劑師或零售藥房。

**【功能、效果】** 伴隨肩頸僵硬的肩膀痠痛、腰痛、關節疼痛、肌肉疼痛、腱鞘炎（手掌、手腕疼痛）、手肘疼痛（網球肘等）、跌打損傷、扭傷

**【用法、用量】** 撕去表面塑膠薄膜後貼於患部，一日最多使用兩次。

〈用法及用量注意事項〉

- (1) 11歲以下兒童請勿使用本產品。
- (2) 如需為11歲以上兒童使用本產品，請務必在有監護人監督陪同的情況下使用。
- (3) 皮膚較敏感者使用本產品前，請先剪下1~2cm，黏貼於手臂內側等敏感部位，並停留至少半天。待確認沒有起疹、發紅、瘙癢、皮膚炎等症狀後方可使用。
- (4) 使用前請先清潔患部皮膚。
- (5) 皮膚較敏感者，請避免在同一部位持續使用本產品。

**【成分、含量】**

成分	含量（每100g膏體中）
吲哚美辛	3.5g
左旋薄荷醇	3.5g

添加物：乙二胺四乙酸二鈉、脂環族飽和烴樹脂、苯乙烯-異戊二烯-苯乙烯嵌段共聚物、二丁基羥基甲苯、聚異丁烯、液體石蠟、其他成分2種。

**保存方法及使用上的注意事項**

- (1) 請保存於陰涼處，避免陽光直射。
- (2) 請保存於兒童無法取得之處。
- (3) 請勿將本品放進其他容器。（以免導致誤用或影響藥品品質。）
- (4) 未使用的部分請放回袋內，將袋口折起並密封後保存。
- (5) 如果使用期限已過，請勿使用。

《包裝》 5.4cm × 8.56cm ..... 20片裝、40片裝、60片裝