

快速缓解难受的疼痛症状

インドメタシン(0.5%)配合

# サロンシップ® インドメタシンEX

Salonsip® Indomethacin EX Indomethacin(0.5%)

〈冰冷型〉镇痛消炎湿布贴剂

## 产品特点

- 添加吡哆美辛，消炎镇痛效果优异。  
「吡哆美辛」能充分深入腰部及关节等疼痛部位，发挥优异的消炎镇痛效果。
- 保湿夹鍊袋设计  
内袋附有保湿夹鍊袋口设计，便于保存、能防止贴布乾燥。

## ⚠ [ 使用注意事项 ]

**⊗ 禁止事項** [ 如果違反本項規定，可能會使症狀惡化，或引發副作用。 ]

1. 有以下情況者，請勿使用本產品。
  - (1) 曾因使用本產品或本產品成分而出現藥物過敏等過敏反應者。
  - (2) 有氣喘病者。
  - (3) 15歲以下兒童。
2. 請勿將本品用於下述部位。
  - (1) 眼睛周圍、黏膜等。
  - (2) 濕疹、皮膚炎、傷口。
  - (3) 香港腳、金錢癬或化膿的患部。

3. 請勿連續使用本產品超過兩週。

## 用藥諮詢

1. 有以下情況者，使用前請諮詢醫師意見，或洽詢藥劑師或零售藥房。
  - (1) 正在接受醫師治療者。
  - (2) 孕婦或可能已懷孕的女性。
  - (3) 曾出現藥物過敏等過敏反應者。
2. 如使用後出現下列症狀，可能是本產品引發的副作用，請立刻停止使用，並持本包裝盒諮詢醫師意見，或洽詢藥劑師或零售藥房。

作用部位	症狀
皮膚	起疹發紅、瘙癢、腫脹、刺痛、灼熱感、乾燥

3. 使用5~6天後，如症狀仍未好轉，請停止使用，並持本包裝盒諮詢醫師意見，或洽詢藥劑師或零售藥房。

**【功能、效果】** 關節疼痛、腱鞘炎（手掌、手腕疼痛）、手肘疼痛（網球肘等）、肌肉疼痛、腰痛、跌打損傷、扭傷、伴隨肩頸僵硬的肩膀痠痛

**【用法、用量】** 撕去表面塑膠薄膜後貼於患部，一日最多使用兩次。

〈用法及用量注意事項〉

- (1) 15歲以下兒童請勿使用本產品。
- (2) 本產品僅能緩解疼痛或浮腫，對造成疼痛或浮腫的病因並無療效，若無上述症狀，請勿使用本產品。
- (3) 患部出汗或濡濕時，請先將水分擦乾後再使用。
- (4) 皮膚較敏感者使用本產品前，請先剪下1~2cm，黏貼於手臂內側等敏感部位，並停留至少半天。待確認沒有起疹、發紅、瘙癢、皮膚炎等症狀後方可使用。

**【成分、含量】** 每100g膏體含 吲哚美辛.....0.5g

添加物：乙二胺四乙酸二鈉、N-甲基吡咯烷酮、左旋薄荷醇、高嶺土、聚羧乙烯、羧甲基纖維素鈉、甘油、矽酸鋁鎂、二氧化鈦、D-山梨糖醇、聚丙烯酸部分中和物、聚氧乙烯氫化蓖麻油、聚乙烯醇（部分皂化物）、水

**保存方法及使用上的注意事項**

- (1) 請保存於陰涼乾燥處，避免陽光直射。
- (2) 請保存於兒童無法取得之處。
- (3) 請勿將本品放入其他容器（以免導致誤用或影響藥品品質）。
- (4) 未使用的部分請放回袋內，將袋口夾鍊密封或折起後保存。
- (5) 如果使用期限已過，請勿使用。

《包裝》 10cm × 14cm ..... 12片裝、24片裝