

商品の特長

- ●有効成分が皮膚から速やかに吸収されて、疲れた筋肉のコリや痛みをほぐします。
- ●柔軟性のある膏体のため、肌にやさしくフィットします。
- ●微香性なので貼ったままでも安心して外出できます。

▲[使用上の注意]

※ してはいけないこと [守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。]

次の部位には使用しないでください。 (1)目の周囲、粘膜等。

(2)湿疹、かぶれ、傷口。

🖉 相談すること

- 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、 この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

| 関係部位 | 症状 |
|------|--------------------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、色素沈着、皮膚はく離 |

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、 この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

【効能・効果】 肩こり、腰痛、筋肉痛、筋肉疲労、打撲、ねんざ、関節痛、骨折痛、しもやけ

【用法・用量】1日数回患部に貼付してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

(1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(2)患部の皮膚は清潔にして貼ってください。(3)皮膚の弱い人は同じ所には続けて貼らないでください。

【成分·分量】

| 成分 | 含量(膏体100g中) |
|-------------|-------------|
| ℓ-メントール | 7.0g |
| サリチル酸グリコール | 5.0g |
| ビタミンE酢酸エステル | 2.0g |
| グリチルレチン酸 | 0.1g |

添加物として、アクリル酸デンプン、酸化チタン、水添ロジングリセリンエステル、スチレン・イソプレン・スチレンブロック共重合体、 BHT、ポリイソブチレン、流動パラフィン、その他1成分を含有します。

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。
(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)。
(4)開封後は袋の口を折りまげ、保管してください。

《包 装》4.8cm × 7.4cm ········2枚入