

商品の特長

●うす型半透明のフィルムを使用。貼ってもめだちません。

●微香性なので、貼ったままでも安心して外出できます。

・ 🕂 [使用上の注意] -

※してはいけないこと [守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。]

次の部位には使用しないでください。 (1)目の周囲、粘膜等。

(2)湿疹、かぶれ、傷口。

🌋 相談すること

- 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、 この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、痛み、色素沈着、皮膚はく離

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、 この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

【効能・効果】 肩こり、腰痛、筋肉痛、筋肉疲労、打撲、ねんざ、関節痛、骨折痛、しもやけ

【用法・用量】1日数回患部に貼付してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)本剤を貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。
- (3)強い刺激を感じることがありますので、入浴の1時間前には本剤をはがしてください。 また、入浴後は30分位してから使用してください。
- (4) 患部の皮膚は清潔にして貼ってください。
- (5)皮膚の弱い人は同じ所には続けて貼らないでください。

【成分·分量】

成分 成分	含量(膏体100g中)
Q-メント ー ル	7.78g
サリチル酸グリコール	5.56g
ノニル酸ワニリルアミド	0.01g

添加物として、アクリル酸デンプン、ケイ酸AI、水添ロジングリセリンエステル、スチレン・イソプレン・スチレンブロック共重合体、 BHT、ポリイソブチレン、流動パラフィン、その他1成分を含有します。

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
(2)小児の手の届かない所に保管してください。
(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)。
(4)開封後は袋の口を折りまげ、保管してください。

《包 装》6.3cm × 8.0cm ·······2枚入