

快速缓解难受的疼痛症状

第二类非处方药

インドメタシン(0.5%)配合

サロンシップ® インドメタシンEX

Salonsip® Indomethacin EX Indomethacin(0.5%)

〈冰冷型〉镇痛消炎湿布贴剂

产品特点

- 添加吲哚美辛配方，镇痛消炎效果优良
“吲哚美辛”能全面渗入腰部、关节等疼痛部位，发挥优异的镇痛消炎效果。
- 附带保湿封口
内袋处附有方便的保湿封口，能有效防止湿布贴剂干燥。

⚠ [使用注意事项]

❌ **禁忌事项** [不遵守禁忌事项，可能会使症状加剧或引发副作用。]

1. 下列人群请勿使用本品。

- (1) 曾因为使用本品或本品成分出现药物过敏等过敏反应的人群。
- (2) 哮喘病史人群。
- (3) 14岁以下儿童。

2. 请勿将本品用于下述部位。

- (1) 眼睛周围、粘膜等。
- (2) 湿疹、皮炎、伤口。
- (3) 患有脚气、体癣等部位或化脓部位

3. 请勿连续使用本品达两周以上。

 需遵医嘱的情况

1. 以下人群请在使用前咨询医生、药师或零售药房。

- (1) 正在接受医生治疗的人群。
- (2) 处于孕期或疑似怀孕的人群。
- (3) 曾出现药物过敏等过敏反应的人群。

2. 如使用后出现下列症状，很有可能是本品引发的副作用，请立刻停止使用，并持本包装盒咨询医生、药师或零售药房。

相关部位	症 状
皮 肤	出疹和发红、瘙痒、肿胀、刺痛、灼烧、干燥

3. 如使用5~6天后症状仍未好转，请立刻停止使用，并持本包装盒咨询医生、药师或零售药房。

【功效】 关节痛、腱鞘炎（手掌、手腕疼痛）、手肘疼痛（网球肘等）、肌肉痛、腰痛、跌打扭伤、因肩膀僵硬所导致的肩膀痛

【用法与用量】 撕去外侧塑料薄膜后贴于患处，一日最多使用两次。

〈用法与用量上的注意事项〉

- (1) 14岁以下儿童请勿使用本品。
- (2) 本品仅能缓解疼痛或浮肿，无法直接治愈造成疼痛或浮肿的病因，请未出现此类症状，请勿使用本品。
- (3) 如出汗或患处被浸湿，请将水分擦干后使用。
- (4) 皮肤敏感人群在使用本品前，请先剪下1~2cm的本品贴于手臂内侧等敏感部位半日以上。如未出现皮疹、发红、瘙痒、皮炎等症状，方可继续使用。

【成分与分量】 每100g膏体中 吲哚美辛.....0.5g

 添加剂：乙二胺四乙酸二钠、N-甲基-2-吡咯烷酮、L-薄荷醇、高岭土、聚羧乙烯、羧甲基纤维素钠、甘油、硅酸铝镁、氧化钛、D-山梨糖醇、聚丙烯酸部分中和物、聚氧乙烯硬化蓖麻油、聚乙烯醇（部分皂化物）、水

保存方法及使用上的注意事项

- (1) 请将本品保存于阴凉干燥处，避免阳光直射。
- (2) 请将本品放在儿童无法触及的地方。
- (3) 请勿将本品放入其他容器（可能会导致误用或影响药品品质）。
- (4) 未使用部分请放回内袋，封好袋口的封口或折好袋口进行保存。
- (5) 请勿使用过期药品。

《包装规格》10cm × 14cm 12贴装、24贴装