

缓解身体的难忍疼痛



## Feitas<sup>®</sup> Z<sub>α</sub> Dicsas<sup>®</sup>

添加2.0%双氯芬酸钠和L-薄荷醇配方

### 产品特点

- 本品为添加2.0%有效成分双氯芬酸钠的经皮外用镇痛消炎贴剂。
- 添加3.5%的L-薄荷醇，提升冰凉触感。
- 强效缓解肩膀、颈部、腰部、关节、肌肉等部位的难忍疼痛。
- 散发淡淡香气，不显眼，可在入睡前使用。
- 本品可全方位伸缩，能够完美贴合肌肤。

### ⚠ [ 使用注意事项 ]

#### ☒ 禁忌事项

[ 不遵守禁忌事项，可能会使症状加剧或引发副作用。 ]

1. 以下人群请勿使用本品。
  - (1) 有对本品或本品成分产生过敏反应经验的人群。
  - (2) 哮喘病史人群。
  - (3) 处于孕期或疑似怀孕的人群。
  - (4) 14岁以下儿童。
2. 请勿将本品用于以下部位。
  - (1) 眼睛周围、粘膜等。
  - (2) 湿疹、皮炎、伤口。
  - (3) 患有脚气、体癣等部位或化脓部位
3. 使用本品期间，请勿同时使用其他外用镇痛消炎药。
4. 请勿连续使用本品达两周以上。



#### 需遵医嘱的情况

1. 以下人群请在使用前咨询医生、药师或零售药房。
  - (1) 正在接受医生治疗的人群。
  - (2) 正在使用其他药品的人群。
  - (3) 有药物过敏史的人群。
  - (4) 曾因使用外用贴剂诱发皮疹等症状的人群。
  - (5) 被诊断出有以下病症的人群。消化性溃疡、血液系统疾病、肝脏疾病、肾脏疾病、高血压、心脏疾病、流感
  - (6) 正在使用以下药品的人群。新喹诺酮类抗菌剂、氨基喋啶、锂、氨甲蝶呤、非甾体抗炎剂、类固醇、利尿剂、环孢菌素、选择性血清素再摄取抑制剂
  - (7) 高龄人群。
2. 如使用后出现以下症状，很有可能是本品引发的副作用，请立刻停止使用，并持本包装盒咨询医生、药师或零售药房。

相关部位	症 状
皮 肤	出疹和发红、瘙痒、皮炎、红肿、皮肤粗糙、刺激感、色素沉淀、水泡、脱屑（掉落皮屑）

本品偶尔会引发下述严重病状。如出现此类症状，请立刻前往医院就诊。

症 状 名 称	症 状
休克 (过敏反应)	使用后立刻出现皮肤瘙痒、荨麻疹、声音嘶哑、打喷嚏、喉咙发痒、呼吸急促、心悸、意识模糊等症状。
接触性皮炎 光线过敏症	粘贴部位出现伴随着强烈瘙痒的出疹、发红、红肿、刺激感、水泡、溃疡等严重皮肤炎症或色素沉淀、白斑，其中出疹、发红、发痒等症可能扩散至全身。此外，被日光照射的部位也可能出现相应症状，并逐渐恶化。

3. 如使用5~6天后症状仍未好转，请立刻停止使用，并持本包装盒咨询医生、药师或零售药房。

**【功效】**腰痛、肌肉痛、因肩膀坚硬所导致的肩膀痛、关节痛、腱鞘炎（手掌、手腕疼痛）、手肘疼痛（网球肘等）、跌打扭伤

**【用法与用量】**撕除外侧塑料薄膜后贴于患处，每天使用1~2次。请不要一次性使用两张以上。  
请不要同时使用包含本品成分的其他外用药。

（用法与用量上的注意事项）

- (1) 14岁以下儿童请勿使用本品。
- (2) 请严格遵守用法与用量。
- (3) 本品仅能缓解疼痛或浮肿，无法直接治愈造成疼痛或浮肿的病因，若未出现疼痛等症状，请勿使用本品。
- (4) 皮肤敏感人群在使用本品前，请先剪下1~2cm的本品贴于手臂内侧等敏感部位半日以上。  
如未出现出疹和发红、瘙痒、皮炎等症状，方可继续使用。
- (5) 请勿一次性使用24小时以上。如需反复贴于同一部位，请在使用前先确认粘贴部位有无出现出疹和发红、瘙痒、皮炎等症状。
- (6) 请勿在同一部位同时使用其他外用药。
- (7) 如出汗或患处被浸湿，请将水分擦干后使用。

**【成分与分量】**

成分	含量（每100g膏体中）
双氯芬酸钠	2.0g
L-薄荷醇	3.5g

添加剂 苯乙烯-异戊二烯-苯乙烯嵌段共聚物、萜烯树脂、二丁基羟基甲苯、聚异丁烯、液体石蜡、其他两种成分。

**保存方法及使用上的注意事项**

- (1) 请将本品保存于阴凉干燥处，避免阳光直射。
- (2) 请将本品放在儿童无法触及的地方。
- (3) 请勿将本品放入其他容器（可能会导致误用或影响药品品质）。
- (4) 请勿使用过期药品。
- (5) 未使用部分请放回内袋，折好袋口进行保存。

《包装规格》7cm×10cm ..... 7贴装、14贴装、21贴装