

缓解强烈痛感

第2类医药品

フェイタス[®]Z_α ディクサス[®] 温感

Feitas[®]Z_α Dicsas[®] Onkan

含双氯芬酸钠贴剂

商品的特点

- 本品为加入有效成分2.0%双氯芬酸钠的经皮镇痛消炎贴剂。
- 本品在缓解肩部和颈部、腰部、关节、肌肉等痛感强烈时表现出良好效果。
- 发挥壬酸香兰基酰胺的功效，带有舒适的温感作用。
- 采用微香型处方，无论是睡觉时还是在人群里也完全无需担心气味对他人的影响。
- 全方向伸缩，完美贴合皮肤。

⚠ [使用上的注意事项]

❌ 禁止事项 [如不遵守，将会导致目前症状恶化或易引起不良反应。]

- 下列人群请勿使用。
 - 对本品或本品成分有过敏史的人。
 - 有哮喘病史的人。
 - 孕妇或可能已怀孕的妇女。
 - 不满15岁的儿童。
- 请勿用于以下部位。
 - 眼周、粘膜等。
 - 湿疹、接触性皮炎、伤口。
 - 足癣、皮癣等或化脓的患部。
- 使用本品期间，请勿使用其他外用消炎镇痛药。
- 请勿连续使用超过2周。

 ■ 谘询事项

- 下列人群请在使用前谘询医生、药剂师或注册经销商。
 - 正在接受医生治疗的人。
 - 正在使用其他医药品的人。
 - 有对药物等过敏史的人。
 - 对贴剂有接触性皮炎史等问题的人。
 - 被诊断为患有下列疾病的人。消化性溃疡、血液障碍性疾病、肝病、肾病、高血压、心脏病、流感
 - 正在使用下列药品的人。新喹诺酮类抗菌药、氨苯蝶啶、锂、甲氨蝶呤、非甾体消炎镇痛剂、甾体剂、利尿剂、环孢菌素、选择性5-羟色胺再摄取抑制剂
 - 老年人。
- 使用后出现下列症状时，因为有可能是药物引起的不良反应，所以请立即停止使用，并持本包装盒谘询医生、药剂师或注册经销商。

相关部位	症 状
皮 肤	发疹与发红、瘙痒、接触性皮炎、肿胀、疼痛、刺痛感、皮肤皸裂、刺激感、色素沉着、水疱疹、皮肤掉屑（皮肤上有细屑脱落）

极少数患者会出现下列严重症状。此时请立即接受医生的诊疗。

症状名称	症 状
休克 (过敏性反应)	使用后立即出现皮肤瘙痒、荨麻疹、声音沙哑、打喷嚏、喉咙发痒、呼吸困难、心悸、意识模糊等症状。
接触性皮炎 光线过敏症	粘贴部出现伴有强烈瘙痒的发疹与发红、肿胀、刺激感、水疱、溃烂等剧烈的皮炎症状及色素沉着、白斑，其中发疹与发红、瘙痒等症状有时会遍及全身。另外，暴露在阳光下的部位有时会出现症状或症状加重。

- 若使用5～6天后症状仍无好转，请停止使用，并持本包装盒项谘询医生、药剂师或注册经销商。

【功能、效果】腰痛、肌肉疼痛、伴随肩酸的肩膀疼痛、关节痛、腱鞘炎（手、手腕疼痛）、手肘疼痛（网球肘等）、挫伤、扭伤

【用法、用量】请剥下塑料膜，每天1次，每次在患部贴1～2片。但是，请勿一次使用超过2片。此外，请勿同时使用含有本成分的其他外用药剂。

〈用法与用量相关的注意事项〉

- （1）未满15岁的儿童请勿使用本品。
- （2）请严格遵守规定的用法和用量。
- （3）本品不能治疗引发疼痛和肿胀等症状的疾病，而是治疗疼痛和肿胀等症状的药剂，因此仅限于出现症状时使用。
- （4）贴上本商品后，患部请勿使用被炉或电热毯。
- （5）请在洗澡前1小时剥除本品，以避免洗澡时皮肤感受到强烈刺激。另外，请在洗澡结束约30分钟之后再使用本品。
- （6）皮肤敏感脆弱的人，使用前请从本品中取1～2厘米大小的方形小片，在手臂内侧皮肤敏感脆弱的部位贴半天以上，确认没有引发发疹与发红、瘙痒、接触性皮炎等症状后再使用。
- （7）皮肤敏感脆弱的人请勿连续在同一个患部使用本品。
- （8）每次粘贴请不要持续超过24小时。并且，在同一个患部重新贴上本品时，请确认该粘贴部没有出现发疹与发红、瘙痒、接触性皮炎等症状后再使用。
- （9）使用本品的部位请勿同时使用其他外用药剂。
- （10）出汗或患部为湿的状态时，请充分擦干后再使用。

【成分、分量】	成分	含量(膏体100g中)
	双氯芬酸钠	2.0g
	0-薄荷醇	3.5g
	壬酸香兰基酰胺	0.01g

添加剂中含有苯乙烯/异戊二烯/苯乙烯嵌段共聚物、萜烯树脂、BHT、聚异丁烯、液状石蜡及其他2种成分。

保管及使用注意事项

- （1）请保管在阴凉干燥处，避免阳光直射。
- （2）请将本品放在儿童接触不到的地方。
- （3）请勿换装到其他容器中（可能造成误用或者变质）。
- （4）本品过期后请勿使用。
- （5）请将未使用的本品放入袋中，将开口部折起关紧后妥善保管。

【包装】 7cm × 10cm 7片装、14片装