

缓解肌肉、关节的难忍疼痛

# エアーサロンパス DX

Air Salonpas DX 添加联苯乙酸3.0%配方

外用镇痛消炎喷剂

**产品特点**

- 本镇痛消炎喷剂添加了能有效对抗炎症、强效镇痛的“联苯乙酸”成分3%，以及能促进血液循环的“l-薄荷醇”成分3%。
- 将本品喷涂于出现关节痛、肌肉痛、跌打扭伤等症状的患处，冷却成分和有效成分“联苯乙酸”能渗入皮肤，缓解难忍疼痛。

**⚠ [ 使用注意事项 ]****☒ 禁忌事项** [不遵守禁忌事项，可能会使症状加剧或引发副作用。]

- 下列人群请勿使用本品。
  - 曾因为使用本品或本品成分出现药物过敏等过敏反应的人群。
  - 哮喘病史人群。
  - 处于孕期或疑似怀孕人群。
  - 14岁以下儿童。
- 请勿将本品用于下述部位。
  - 眼睛周围、粘膜等。
  - 湿疹、皮炎、伤口。
  - 化脓部位。

**就医嘱的情况**

- 以下人群请在使用前咨询医生、药师或零售药房。
  - 正在接受医生治疗的人群。
  - 曾出现药物过敏等过敏反应的人群。
- 如使用后出现下列症状，很有可能是本品引发的副作用，请立刻停止使用，并持本说明书咨询医生、药师或零售药房。

相关部位	症 状
皮 肤	出疹和发红、肿胀、瘙痒、刺痛、皮炎

本品偶尔会引发下述严重病状。如出现此类症状，请立刻前往医院就诊。

症状名称	症 状
休克 (过敏反应)	使用后立刻出现皮肤瘙痒、荨麻疹、声音嘶哑、打喷嚏、喉咙发痒、呼吸急促、心悸、意识模糊等症状。


- 如使用1周后症状仍未好转，请立刻停止使用，并持本说明书咨询医生、药师或零售药房。

**【功效】** 因肩膀坚硬所导致的肩膀痛、腰痛、关节痛、肌肉痛、跌打扭伤、腱鞘炎（手、手腕、脚腕疼痛）、手肘疼痛（网球肘等）

### **【用法与用量】** 直接喷涂于患处，每日2~4次，每次适量。

（用法与用量上的注意事项）

- (1) 14岁以下儿童请勿使用本品。
- (2) 请严格遵守用法与用量。
- (3) 请注意避免药液进入眼睛。如不慎入眼，请立刻用凉水或温水冲洗。  
如症状加剧，请前往眼科就诊。
- (4) 请勿面向面部喷涂。
- (5) 请勿大面积或大量喷涂本品。
- (6) 本品仅限外用，请勿吸入本品。吸入本品可能导致头晕、恶心、咳嗽、刺激鼻腔喉咙等症状，使用时请尽量避免吸入，也请让周围人群注意。
- (7) 请在充分摇匀药液后，将喷嘴冲下进行喷涂（向上和向两侧使用会导致只有气体喷出、药液残余或药液四处飞溅等问题）。
- (8) 请在距离患处10cm的位置进行喷涂。
- (9) 请勿在同一部位连续喷涂3秒以上（可能引起冻伤）。
- (10) 如需在肩膀、颈部等部位使用，请将药液喷在手掌后进行涂抹。
- (11) 使用后，请勿用保鲜膜等透气性差的物品包覆患部。



### **【成分与分量】**

成分	含量（每100g原液中）
联苯乙酸	3g
L-薄荷醇	3g

添加剂：乙醇、三乙醇胺、羟丙甲纤维素、聚氧乙烯硬化蓖麻油、二甲醚

### **保存方法及使用上的注意事项**

- (1) 请盖好瓶盖后将本品保存于阴凉干燥处，避免阳光直射。
- (2) 请将本品放在儿童无法触及的地方。
- (3) 请勿将本品放入其他容器（可能会导致误用或影响药品品质）。
- (4) 请注意不要让本品附着在衣物、家具、皮革制品、化学合成品等物品上。可能会引发物品变质或变色。
- (5) 严禁将本品靠近火种。
- (6) 严禁在有火光的地方使用本品。

《包装规格》 80mL、120mL

### **【废弃时的排气方法及注意事项】**

#### **〈排气注意事项〉**

- 使用完毕后，请将本品置于没有火种、通风良好的室外进行排气。
- 排气过程中，请勿将本品靠近脸部。此时残留药液可能会与气体一并喷出。
- 除瓶盖外，本品的其他部分均不可重复利用。
- 请注意避免直接吸入本品喷出的气体。

#### **〈排气方法〉**

※下图为产品说明书。样品外观不同于实际产品。

- ①按下“PUSH”标识即可拆下按 钮和肩盖。
- ②拔出喷涂按钮。
- ③摘除盖子上层，将其倒置在 平台上。
- ④以瓶身上下颠倒的状态按压盖 子外层中间的孔洞，直至喷气音消 失为止。
- ⑤待喷气音完全消失后，请按 地方规定的方法进行丢弃。

