

缓解腰部及膝盖的难忍疼痛

フェイタス[®]Zクリーム 微香性

Feitas Z Cream 淡香型

添加1.0%双氯芬酸钠

产品特点

- 本品添加有效成分双氯芬酸钠，能强效缓解肩膀、腰部、关节等部位的难忍疼痛。
- 霜剂质地爽滑不黏腻，延展性佳，使用少量即可均匀涂抹患处。
- 散发淡淡香气，不显眼，可在睡前使用。
- 层压软管设计，充分挤出所有药剂，避免浪费。

⚠ [使用注意事项]**☒ 禁忌事项** [不遵守禁忌事项，可能会使症状加剧或引发副作用。]

- 下列人群请勿使用本品。
 - 曾因为使用本品或本品成分出现药物过敏等过敏反应的人群。
 - 哮喘病史人群。
 - 处于孕期或疑似怀孕的人群。
 - 14岁以下儿童。
- 请勿将本品用于下述部位。
 - 眼睛周围、粘膜等。
 - 皮肤薄弱的部位（面部、头部、腋下等）。
 - 湿疹、皮炎、伤口。
 - 患有脚气、体癣等部位或化脓部位。
- 使用本品期间，请勿同时使用其他消炎镇痛外用药。
- 请勿长时间使用本品。

就医嘱的情况

- 下列人群请在使用前咨询医生、药师或零售药房。
 - 正在接受医生治疗的人群。
 - 曾出现药物过敏等过敏反应的人群。
 - 正在使用下述药品的人群。新喹诺酮类抗菌剂
- 如使用后出现下列症状，很有可能是本品引发的副作用，请立即停止使用，并持本包装盒咨询医生、药师或零售药房。

相关部位	症 状
皮 肤	出疹和发红、瘙痒、皮炎、红肿、疼痛、刺激感、灼烧、皮肤粗糙、脱屑（皮肤脱落如头皮屑、皮垢状碎屑）、水泡、色素沉淀

本品偶尔会引发下述严重病状。如出现此类症状，请立刻前往医院就诊。

症状名称	症 状
休克 (过敏反应)	使用后立刻出现皮肤瘙痒、荨麻疹、声音嘶哑、打喷嚏、喉咙发痒、呼吸急促、心悸、意识模糊等症状。
接触性皮炎 光线过敏症	涂抹部位出现伴随着强烈瘙痒的出疹、发红、红肿、刺激感、水泡、溃疡等严重皮肤炎症或色素沉淀、白斑，其中出疹、发红、发痒等症状可能扩散至全身。此外，被日光照射的部位也可能出现相应症状，并逐渐恶化。

- 如使用5~6天后症状仍未好转，请立刻停止使用，并持本说明书咨询医生、药师或零售药房。

【功效】腰痛、因肩膀坚硬所导致的肩膀痛、关节痛、肌肉痛、腱鞘炎（手掌、手腕疼痛）、手肘疼痛（网球肘等）、跌打扭伤

【用法与用量】直接涂抹于患处，每日3~4次，每次适量。使用后，请勿用保鲜膜等透气性差的物品包覆患处。
请不要同时使用包含本品成分的其他外用药。

〈用法与用量上的注意事项〉

- (1) 请严格遵守用法与用量。
- (2) 本品仅限外用，请勿内服。
- (3) 每周请勿使用50g以上。
- (4) 请注意避免药液进入眼睛。如不慎入眼，请立刻用凉水或温水冲洗。如症状加剧，请前往眼科就诊。
- (5) 使用后，请勿用保鲜膜等透气性差的物品包覆患处。
- (6) 使用后请立刻洗手。

【成分与分量】

成分	含量（每1g）
双氯芬酸钠	10mg

添加剂：L-薄荷醇、白凡士林、肉豆蔻酸异丙酯、角鲨烷、丙二醇、聚氧乙烯硬化蓖麻油、二丁基羟基甲苯、对羟基苯甲酸甲酯、对羟基苯甲酸丁酯、聚羧乙烯、pH调节剂、其他两种成分。

【保存方法及使用上的注意事项】

- (1) 请将本品密封后保存于阴凉处，避免阳光直射。
- (2) 请将本品放在儿童无法触及的地方。
- (3) 请勿将本品放入其他容器（可能会导致误用或影响药品品质）。
- (4) 请勿使用过期药品（使用期限印刷在纸盒及容器上）。为保证药品品质，即使仍在保质期内，也请在开封后尽快使用。

《包装规格》 30 g