

缓解颈部及肩部的难忍疼痛

フェイタス[®] Z_α ローション 微香性

Feitas[®] Z_α Lotion 淡香型

添加1.0%双氯芬酸钠

产品特点

- 本品添加有效成分双氯芬酸钠，能强效缓解肩膀、腰部、关节等部位的难忍疼痛。
- 添加3.0%的L-薄荷醇，体感清爽舒适。
- 采用便于手持涂抹的独特瓶装设计，轻松涂抹肩颈等部位，不会弄脏双手。
- 无异味，散发淡淡香气，适用于各种场合。

⚠ [使用注意事项]

❌ 禁忌事项 [不遵守禁忌事项，可能会使症状加剧或引发副作用。]

1. 下列人群请勿使用本品。
 - (1) 曾因为使用本品或本品成分出现药物过敏等过敏反应的人群。
 - (2) 哮喘病史人群。
 - (3) 处于孕期或疑似怀孕的人群。
 - (4) 14岁以下儿童。
2. 请勿将本品用于下述部位。
 - (1) 眼睛周围、粘膜等。
 - (2) 皮肤薄弱的部位（面部、头部、腋下等）。
 - (3) 湿疹、皮炎、伤口。
 - (4) 患有脚气、体癣等部位或化脓部位。
3. 使用本品期间，请勿同时使用其他外用镇痛消炎药。
4. 请勿长时间使用本品。



需遵医嘱的情况

1. 以下人群请在使用前咨询医生、药师或零售药房。
 - (1) 正在接受医生治疗的人群。
 - (2) 曾出现药物过敏等过敏反应的人群。
 - (3) 正在使用下述医药品的人群。新喹诺酮类抗菌剂
2. 如使用后出现下列症状，很有可能是本品引发的副作用，请立即停止使用，并持本包装盒咨询医生、药师或零售药房。

相关部位	症 状
皮 肤	出疹和发红、瘙痒、皮炎、红肿、皮肤粗糙、刺激感、色素沉淀、水泡、脱屑（掉落皮屑）

本品偶尔会引发下述严重病状。如出现此类症状，请立刻前往医院就诊。

症状名称	症 状
休克 (过敏反应)	使用后立刻出现皮肤瘙痒、荨麻疹、声音嘶哑、打喷嚏、喉咙发痒、呼吸急促、心悸、意识模糊等症状。
接触性皮炎 光线过敏症	涂抹部位出现伴随着强烈瘙痒的出疹、发红、红肿、刺激感、水泡、溃疡等严重皮肤炎症或色素沉淀、白斑，其中出疹、发红、发痒等症状可能扩散至全身。此外，被日光照射的部位也可能出现相应症状，并逐渐恶化。

3. 如使用5~6天后症状仍未好转，请立刻停止使用，并持本说明书咨询医生、药师或零售药房。

【功效】腰痛、肌肉痛、因肩膀坚硬所导致的肩膀痛、关节痛、腱鞘炎（手掌、手腕疼痛）、手肘疼痛（网球肘等）、跌打扭伤

【用法与用量】直接涂抹于患处，每日3～4次，每次适量。使用后，请勿用保鲜膜等透气性差的物品包敷患处。
请不要同时使用包含本品成分的其他外用药。

〈用法与用量上的注意事项〉

- (1) 14岁以下儿童请勿使用本品。
- (2) 请严格遵守用法与用量。
- (3) 本品仅能缓解疼痛或浮肿，无法直接治愈造成疼痛或浮肿的病因，若未出现疼痛等症状，请勿使用本品。
- (4) 本品仅限外用。
- (5) 每周请勿使用50mL以上。
- (6) 请注意避免药液进入眼睛。如不慎入眼，请立刻用凉水或温水冲洗。如症状加剧，请前往眼科就诊。
- (7) 请勿在同一部位同时使用其他外用药。
- (8) 使用后，请勿使用通气性差的物品（保鲜膜、校正带等）包覆或密封患处。

【成分与含量】	成分	含量（每100g）
	双氯芬酸钠	1g
	L-薄荷醇	3g

添加剂 己二酸二异丙酯、异丙醇、乳酸、丙二醇、聚山梨醇酯80

保存方法及使用上的注意事项

- (1) 请将本品保存于阴凉处，避免阳光直射。
- (2) 请将本品放在儿童无法触及的地方。
- (3) 请勿将本品放入其他容器（可能会导致误用或影响药品品质）。
- (4) 严禁将本品靠近火种。
- (5) 本品可能引发眼镜、钟表、首饰等金属制品、化纤衣物、塑料制品、地板及家具等涂层的变质或变色，请勿在此类物品上使用本品。
- (6) 请勿使用过期药品。

严禁烟火		
第二石油类	水溶性	危险等级III（异丙醇、丙二醇）

《包装规格》 50mL