

杀菌、止痒、抗菌

ブテナロック[®]V_α クリーム

Butenalock[®]V_α Cream

治疗脚气、手足癣，盐酸布替萘芬配方


产品特点

- 脚气、手足癣是名为白癣菌的真菌寄生在皮肤表面角质层所引起的疾病。白癣菌会侵蚀皮肤表面角质层等部位的角蛋白，并引发瘙痒。
- Butenalock V_α霜剂能有效杀灭引发脚气的病菌（白癣菌），针对脚气、手足癣进行治疗。

添加强效杀菌成分“盐酸布替萘芬”。能有效治疗瘙痒难受的脚气！

- 深入渗透至角质层，杀灭引发脚气的病菌（白癣菌）。
- 除止痒成分“马来酸氯苯那敏”、“盐酸地布卡因”、“克罗米通”外，另添加L-薄荷醇，清凉舒适，缓解瘙痒。
- 含有杀菌成分“异丙基苯酚”。
- 含有抑制炎症成分“甘草次酸”。
- 长效存留于皮肤，一日一次即可有效治疗疾病。

Butenalock V_α【霜剂】的适用范例 (也可用于其它症状)



⚠ [使用注意事项]

❌ 禁忌事项 [不遵守禁忌事项，可能会使症状加剧或引发副作用。]

1. 下列人群请勿使用本品。
曾因为使用本品或本品成分出现过敏反应的人群。
2. 请勿将本品用于下述部位。
 - (1) 眼部及周围、粘膜（口腔、鼻腔、阴道等）、阴囊、外阴等。
 - (2) 湿疹。
 - (3) 湿疹、溃疡、开裂或外伤过于严重的患处。



需遵医嘱的情况

1. 以下人群请在使用前咨询医生、药师或零售药房。
 - (1) 正在接受医生治疗的人群。
 - (2) 处于孕期或疑似怀孕的人群。
 - (3) 婴幼儿。
 - (4) 曾出现药物过敏等过敏反应的人群。
 - (5) 患处位于面部或患处面积较大的人群
 - (6) 患处化脓的人群。
 - (7) 无法确诊所患疾病究竟是“湿疹”，还是“脚气、股癣、体癣”的人群。
(如阴囊出现瘙痒、溃疡等症状，通常都是由于湿疹等其他原因引发)
2. 如使用后出现下列症状，很有可能是本品引发的副作用，请立即停止使用，并持本包装盒咨询医生、药师或零售药房。

相关部位	症状
皮肤	出疹和发红、瘙痒、皮炎、红肿、刺激感、灼热、脱屑、溃疡、水泡、干燥感、发麻、开裂

3. 如使用2周后症状仍未好转，请立刻停止使用，并持本说明书咨询医生、药师或零售药房。

【功效】 脚气、股癣、体癣

【用法与用量】 直接涂抹于患处，每天一次，每次适量。

〈用法与用量上的注意事项〉

- (1) 使用本品前，请先清洁患处及其周围皮肤。
- (2) 请注意避免药液进入眼睛。如不慎入眼，请立刻用凉水或温水冲洗，并立即前往眼科就诊。
- (3) 儿童需在监护人的监督指导下使用本品。
- (4) 本品仅限外用。

【成分与分量】

成分	含量（每1g）	成分	含量（每1g）
盐酸布替萘芬	10mg	L-薄荷醇	20mg
盐酸地布卡因	2mg	克罗米通	10mg
马来酸氯苯那敏	5mg	异丙基甲基苯酚	3mg
甘草次酸	2mg		


添加剂：鲸蜡醇乙基己酸酯、二乙醇胺、自乳化型单硬脂酸甘油酯、二甲基聚硅氧烷、鲸蜡硬脂醇、对羟基苯甲酸酯、二丁基羟甲基苯、丙二醇、山嵛醇、聚氧乙烯二十二基醚、肉豆蔻酸异丙酯

保存方法及使用上的注意事项

- (1) 请将本品密封后保存于阴凉处，避免阳光直射。
- (2) 请将本品放在儿童无法触及的地方。
- (3) 请勿将本品放入其他容器（可能会导致误用或影响药品品质）。
- (4) 请勿使用过期药品。为保证药品品质，即使仍在保质期内，也请在开封后尽快使用。

《包装规格》 18g

【管孔的开启方法】



●请将盖子顶部的突起部位用力压向管口。

治疗脚气的五大要点

<p>1 日常护理时请注意避免双脚长时间处于潮热环境。 白癣菌易在15°C、湿度70%以上的环境下滋生。请注意保持干燥环境，避免潮热出现。</p>	
<p>2 保持患部清洁 每日用肥皂仔细清洗。 使用本品时，除每日一次用药外，患者需注意保持患处清洁，避免长时间处于潮热环境，鞋袜需勤换洗。</p>	
<p>3 用药时请在患处及其周围轻轻涂抹一层本品。 白癣菌的寄生范围在多数情况下都会比出现症状的患处更为宽泛，用药时请大面积进行涂抹。</p>	
<p>4 症状消退后，应继续涂抹脚气治疗药一个月以上。 症状消退时，可能仅仅抑制了白癣菌活动，未彻底杀灭。只有坚持涂药，才能彻底治愈疾病。</p>	
<p>5 家中如有其他脚气患者请一同接受治疗。 容易被家中其他脚气患者传染。如感觉不适请注意及早治疗</p>	

治疗脚气需要重视日常全面的足部护理。