

ブテナロックL パウダーゲル

Butenalock[®]L Powder gel


脚气、手足癣治疗药

产品特点

- 脚气、手足癣是名为白癣菌的真菌寄生在皮肤表面角质层所引起的疾病。白癣菌会侵蚀皮肤表面角质层等部位的角蛋白，并引发瘙痒。
- Butenalock L凝胶粉能有效杀灭引发脚气的病菌（白癣菌），针对脚气、手足癣进行治疗。

- 深入渗透至角质层，杀灭引发脚气的病菌（白癣菌）。
- 长效存留于皮肤，一日一次即可有效治疗疾病。
- 本品为添加1%盐酸布替萘芬配方的脚气、手足癣治疗凝胶粉。

Butenalock L【凝胶粉】的适用范例 （也可用于其它症状）



⚠ [使用注意事项]

❌ 禁忌事项 [不遵守禁忌事项，可能会使症状加剧或引发副作用。]

1. 下列人群请勿使用本品。
曾因为使用本品或本品成分出现过敏反应的人群。
2. 请勿将本品用于下述部位。
 - (1) 眼部及周围、粘膜（口腔、鼻腔、阴道等）、阴囊、外阴等。
 - (2) 湿疹。
 - (3) 湿疹、溃疡、开裂或外伤过于严重的患处。



需遵医嘱的情况

1. 以下人群请在使用前咨询医生、药师或零售药房。
 - (1) 正在接受医生治疗的人群。
 - (2) 处于孕期或疑似怀孕的人群。
 - (3) 婴幼儿。
 - (4) 曾出现药物过敏等过敏反应的人群。
 - (5) 患处位于面部或患处面积较大的人群。
 - (6) 患处化脓的人群。
 - (7) 无法确诊所患疾病究竟是“湿疹”，还是“脚气、股癣、体癣”的人群。
（如阴囊出现瘙痒、溃疡等症状，通常都是由于湿疹等其他原因引发）
2. 如使用后出现下列症状，很有可能是本品引发的副作用，请立即停止使用，并持本包装盒咨询医生、药师或零售药房。

相关部位	症 状
皮 肤	出疹和发红、瘙痒、皮炎、红肿、刺激感、脱屑、溃疡、水泡、开裂

3. 如使用2周后症状仍未好转，请立刻停止使用，并持本说明书咨询医生、药师或零售药房。

【功效】脚气、股癣、体癣

【用法与用量】 直接涂抹于患处，每天一次，每次适量。

〈用法与用量上的注意事项〉

- (1) 使用本品前，请先清洁患处及其周围皮肤。
- (2) 请注意避免药液进入眼睛。如不慎入眼，请立刻用凉开水或温水冲洗，并立即前往眼科就诊。
- (3) 儿童需在监护人的监督指导下使用本品。
- (4) 本品仅限外用。

【成分与分量】

成分	含量（每1g）
盐酸布替蔡芬	10mg
盐酸地布卡因	2mg
L-薄荷醇	20mg
尿囊素	1mg

添加剂: 乙醇、聚羧乙烯、滑石、羟丙基甲基纤维素、香料

保存方法及使用上的注意事项

- (1) 请将本品密封后保存阴凉处，避免阳光直射。
- (2) 请将本品放在儿童无法触及的地方。
- (3) 请勿将本品放入其他容器（可能会导致误用或影响药品品质）。
- (4) 请勿使用过期药品。为保证药品品质，即使仍在保质期内，也请在开封后尽快使用。
- (5) 严禁将本品靠近火种或投入火中。严禁将用完的容器投入火中。

《包装规格》 15g

治疗脚气的五大要点

1 日常护理时请注意避免双脚长时间处于潮热环境。
白癣菌易在15℃、湿度70%以上的环境下滋生。
请注意保持干燥环境，避免潮热出现。



4 症状消退后，应继续涂抹脚气治疗药一个月以上。

症状消退时，可能仅仅抑制了白癣菌活动，未彻底杀灭。只有坚持涂药，才能彻底治愈疾病。




2 保持患部清洁

每日用肥皂仔细清洗。

使用本品时，除每日一次用药外，患者需注意保持患处清洁，避免长时间处于潮热环境，鞋袜需勤换洗。



**5 家中如有其他脚气患者
请一同接受治疗。**
容易被家中其他脚气患者传染。
如感觉不适请注意及早治疗



3 用药时请在患处及其周围轻轻涂抹一层本品。

白癣菌的寄生范围在多数情况下都会比出现症状的患处更为宽泛，用药时请大面积进行涂抹。



治疗脚气需要重视日常全面的足部护理。