

缓解身体的难忍疼痛



Feitas® Zα Dicsas® Oban

添加2.0%双氯芬酸钠和L-薄荷醇配方

產品特點

- 本產品為經皮消炎鎮痛貼布，有效成分為2.0%的雙氯芬酸鈉。
- 添加3.5%的左旋薄荷醇，提升清涼效果。
- 功效卓著，能緩解肩膀、頸部、腰部、關節和肌肉等疼痛。
- 散發淡淡香氣，不引人注意、不干擾睡眠。
- 可全方位伸縮，與肌膚完美貼合。
- 尺寸加大，腰部等較大面積的患部一張搞定。

⚠ [使用注意事項]

❌ 禁止事項 [如果違反本項規定，可能會使症狀惡化，或引發副作用。]

- 有以下情況者，請勿使用本產品。
 - (1) 曾因使用本產品或本產品成分而出現過敏反應者。
 - (2) 有氣喘病者。
 - (3) 孕婦或可能已懷孕的女性。
 - (4) 15歲以下兒童。
- 請勿將本產品用於下列部位。
 - (1) 眼睛周圍、黏膜等。
 - (2) 濕疹、皮膚炎、傷口。
 - (3) 香港腳、金錢癬或化膿的患部。
- 使用本產品期間，請勿同時併用其他外用消炎鎮痛藥。
- 請勿連續使用本產品超過兩週。

🗣 用藥諮詢

- 有以下情況者，使用前請諮詢醫師意見，或洽詢藥劑師或零售藥房。
 - (1) 正在接受醫師治療者。
 - (2) 正在使用其他醫藥品者。
 - (3) 有藥物過敏病史者。
 - (4) 曾因使用外用貼布而出現藥疹等症狀者。
 - (5) 被診斷出有下列病症者。消化性潰瘍、血液系統疾病、肝臟疾病、腎臟疾病、高血壓、心臟疾病、流感
 - (6) 正在使用下列醫藥品者。新奎諾酮類抗菌劑、氨基喋啶、鋰、氨甲蝶呤、非類固醇消炎鎮痛藥、類固醇、利尿劑、環孢菌素（環孢靈）、選擇性血清素再攝取抑制劑
 - (7) 高齡人士。
- 如使用後出現下列症狀，可能是本產品引發的副作用，請立刻停止使用，並持本包裝盒諮詢醫師意見，或洽詢藥劑師或零售藥房。

作用部位	症 狀
皮 膚	起疹發紅、瘙癢、皮膚炎、紅腫、皮膚粗糙、刺激感、色素沉澱、水泡、脫屑（表皮呈碎屑狀脫落）

本產品在極少數案例中會引發下列嚴重症狀。若出現下列症狀，請立即接受醫師治療。

症狀名稱	症 狀
休克 （過敏反應）	使用後立刻出現皮膚瘙癢、蕁麻疹、聲音嘶啞、打噴嚏、喉嚨發癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等症狀。
接觸性皮膚炎 光過敏症	黏貼部位出現伴隨著強烈瘙癢的起疹和發紅、紅腫、刺激感、水泡、潰瘍等嚴重皮膚炎症或色素沉澱、白斑，其中起疹發紅、發癢等症狀可能擴散至全身。被陽光照射過的部位也可能出現同樣的症狀、或發生惡化的情況。

- 使用5~6天後，如症狀仍未好轉，請停止使用，並持本包裝盒諮詢醫師意見，或洽詢藥劑師或零售藥房。

【功能、效果】 腰痛、肌肉疼痛、伴隨肩頸僵硬的肩膀痠痛、關節疼痛、腱鞘炎（手掌、手腕疼痛）、手肘疼痛（網球肘等）、跌打損傷

【用法、用量】 撕去表面塑膠薄膜後貼於患部，每日一次、每次1張。每次請勿使用超過一張。
同時請勿併用含本成分的外用藥。

〈用法及用量注意事項〉

- (1) 15歲以下兒童請勿使用本產品。
- (2) 請嚴格遵守用法與用量。
- (3) 本產品僅能緩解疼痛或浮腫，對造成疼痛或浮腫的病因並無療效，若無上述症狀，請勿使用本產品。
- (4) 皮膚較敏感者使用本產品前，請先剪下1～2cm，黏貼於手臂內側等敏感部位，並停留至少半天。待確認沒有起疹、發紅、瘙癢、皮膚炎等症狀後方可使用。
- (5) 每次使用時，請勿持續黏貼24小時以上。如需在同一患部更換貼布，請先確認該部位有無起疹、發紅、瘙癢、藥布疹等症狀，待確認無上述症狀後方可使用。
- (6) 請勿在同一患部併用其他外用藥。
- (7) 患部出汗或濡濕時，請先將水分擦乾後再使用。

成分	含量（每100g膏體中）
雙氯芬酸鈉	2.0g
左旋薄荷醇	3.5g

添加物：苯乙烯-異戊二烯-苯乙烯嵌段共聚物、粘烯樹脂、二丁基羥基甲苯、聚異丁烯、液狀石蠟、其他成分2種。

保存方法及使用上的注意事項

- (1) 請保存於陰涼乾燥處，避免陽光直射。
- (2) 請保存於兒童無法取得之處。
- (3) 請勿將本品放入其他容器（以免導致誤用或影響藥品品質）。
- (4) 如果使用期限已過，請勿使用。
- (5) 未使用的部分請放回袋內，將袋口折起並密封後保存。

《包裝》 10cm × 14cm 7片裝