

緩解強烈痛感

フェイス®Zα ディクサス® 温感 大判

Feitas®Zα Dicsas® Onkan Oban

含雙氯芬酸鈉貼布

商品的特點

- 本品為加入有效成分2.0%雙氯芬酸鈉的經皮消炎鎮痛貼劑。
- 本品在緩解肩部和頸部、腰部、關節、肌肉等強烈痛感時表現出良好效果。
- 發揮壬酸香蘭基醯胺的功效，帶有舒適的溫感作用。
- 採用微香型處方，無論是睡覺時還是在人群裡也完全無需擔心氣味對他人的影響。
- 全方向伸縮，完美貼合皮膚。
- 僅用一片就能覆蓋腰部等大面積患部、大尺寸。

⚠️ [使用上の注意事項]

❌ 禁止事項 [如不遵守，將會導致目前症狀惡化或易引起不良反應。]

- 下列人群請勿使用。
 - (1) 對本品或本品成分有過敏史的人。
 - (2) 有哮喘病史的人。
 - (3) 孕婦或可能已懷孕的婦女。
 - (4) 不滿15歲的兒童。
- 請勿用於以下部位。
 - (1) 眼周、黏膜等。
 - (2) 濕疹、接觸性皮膚炎、傷口。
 - (3) 足癬、皮癬等或化膿的患部。
- 使用本品期間，請勿使用其他外用消炎鎮痛藥。
- 請勿連續使用超過2周。

👤 諮詢事項

- 下列人群請在使用前諮詢醫生、藥劑師或註冊經銷商。
 - (1) 正在接受醫生治療的人。
 - (2) 正在使用其他醫藥的人。
 - (3) 有對藥物等過敏史的人。
 - (4) 對貼布有接觸性皮膚炎等問題的人。
 - (5) 被診斷為患有下列疾病的人。消化性潰瘍、血液障礙性疾病、肝病、腎病、高血壓、心臟病、流感
 - (6) 正在使用下列藥品的人。新喹諾酮類抗菌藥、氨基蝶啶、鋰、甲氨蝶呤、非甾體消炎鎮痛劑、甾體劑、利尿劑、環孢菌素、選擇性5-羟色胺再攝取抑制劑
 - (7) 高齡者。
- 使用後出現下列症狀時，因為有可能是藥物引起的不良反應，所以請立即停止使用，並持本包裝盒諮詢醫生、藥劑師或註冊經銷商。

相關部位	症 狀
皮 膚	發疹與發紅、搔癢、接觸性皮膚炎、腫脹、疼痛、刺痛感、皮膚皸裂、刺激感、色素沈澱、水皰疹、皮膚掉屑（皮膚上有細屑脫落）

極少數患者會出現下列嚴重症狀。此時請立即接受醫生的診療。

症狀名稱	症 狀
休克 (過敏性反應)	使用後立即出現皮膚搔癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨發癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等症狀。
接觸性皮膚炎 光線過敏症	黏貼部出現伴有強烈搔癢的發疹與發紅、腫脹、刺激感、水皰、潰爛等劇烈的皮炎症狀及色素沈澱、白斑，其中發疹與發紅、搔癢等症狀有時會遍及全身。另外，暴露在陽光下的部位有時會出現症狀或症狀加重。

- 若使用5~6天後症狀仍無好轉，請停止使用，並持本說明書諮詢醫生、藥劑師或註冊經銷商。

【功能、效果】腰痛、肌肉疼痛、伴隨肩酸的肩膀疼痛、關節痛、腱鞘炎（手、手腕疼痛）、手肘疼痛（網球肘等）、挫傷、扭傷

【用法、用量】請撕下膠膜，每天1次，每次在患部貼1片。但是，請勿一次使用超過1片。此外，請勿同時使用含有本成分的其他外用藥劑。

〈用法與用量相關的注意事項〉

- （1）未滿15歲的兒童請勿使用本品。
- （2）請嚴格遵守規定的用法和用量。
- （3）本品不能治療引發疼痛和腫脹等症狀的疾病，而是治療疼痛和腫脹等症狀的藥劑，因此僅限於出現症狀時使用。
- （4）貼上本商品後，患部請勿使用被爐或電熱毯。
- （5）請在洗澡前1小時撕除本品，以避免洗澡時皮膚感受到強烈刺激。另外，請在洗澡結束約30分鐘之後再使用本品。
- （6）皮膚敏感脆弱的人，使用前請從本品中取1～2厘米大小的方形小片，在手臂內側皮膚敏感脆弱的部位貼半天以上，確認沒有引發發疹與發紅、搔癢、接觸性皮膚炎等症狀後再使用。
- （7）皮膚敏感脆弱的人請勿連續在同一個患部使用本品。
- （8）每次黏貼請不要持續超過24小時。並且，在同一個患部重新貼上本品時，請確認該黏貼部沒有出現發疹與發紅、搔癢、接觸性皮膚炎等症狀後再使用。
- （9）使用本品的部位請勿同時使用其他外用藥劑。
- （10）出汗或患部為濕的狀態時，請充分擦乾後再使用。

成分	含量(膏體100g中)
雙氯芬酸鈉	2.0g
0-薄荷醇	3.5g
壬酸香蘭基醯胺	0.01g

添加劑中含有苯乙烯/異戊二烯/苯乙烯嵌段共聚物、粘烯樹脂、BHT、聚異丁烯、液狀石蠟及其他2種成分。

保管及使用注意事項

- （1）請保管在陰涼乾燥處，避免陽光直射。
- （2）請將本品放在兒童接觸不到的地方。
- （3）請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）。
- （4）本品過期後請勿使用。
- （5）請將未使用的本品放入袋中，將開口部折緊後妥善保管。

【包裝】10cm × 14cm 7片裝