

缓解肌肉、关节的难忍疼痛

エアースロンパス[®]DX

フェルビナク 3.0%配合

Air[®]Salonpas[®]DX 添加联苯乙酸 3.0%配方

外用镇痛消炎喷剂

产品特点

- 本消炎镇痛喷剂含 3%「联苯乙酸」、能有效消炎镇痛，並添加 3%「左旋薄荷醇」，可促進血液循環。
- 將本產品噴塗於關節疼痛、肌肉疼痛、跌打損傷等患部，既可發揮冷卻效果，又能透過皮膚吸收有效成分「联苯乙酸」，緩解惱人的疼痛。

⚠ [使用注意事項]

❌ 禁止事項 [如果違反本項規定，可能會使症狀惡化，或引發副作用。]

- 有以下情況者，請勿使用本產品。
 - (1) 曾因使用本產品或本產品成分而出現藥物過敏等過敏反應者。
 - (2) 有氣喘病者。
 - (3) 孕婦或可能已懷孕的女性。
 - (4) 15歲以下兒童。
- 請勿將本品用於下述部位。
 - (1) 眼睛周圍、黏膜等。
 - (2) 濕疹、皮膚炎、傷口。
 - (3) 化膿部位。



用藥諮詢

- 有以下情況者，使用前請諮詢醫師意見，或洽詢藥劑師或零售藥房。
 - (1) 正在接受醫師治療者。
 - (2) 曾出現藥物過敏等過敏反應者。
- 如使用後出現下列症狀，可能是本產品引發的副作用，請立刻停止使用，並持本說明書諮詢醫師意見，或洽詢藥劑師或零售藥房。

作用部位	症 狀
皮 膚	起疹發紅、腫脹、瘙癢、刺痛、皮膚炎

本產品在極少數案例中會引發下列嚴重症狀。若出現下列症狀，請立即接受醫師治療。

症狀名稱	症 狀
休克 (過敏反應)	使用後立刻出現皮膚瘙癢、蕁麻疹、聲音嘶啞、打噴嚏、喉嚨發癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等症狀。


- 使用一週後，如症狀仍未好轉，請停止使用，並持本說明書諮詢醫師意見，或洽詢藥劑師或零售藥房。

【功能、效果】 伴隨肩頸僵硬的肩膀痠痛、腰痛、關節疼痛、肌肉疼痛、跌打損傷、腱鞘炎（手掌、手腕、腳踝疼痛）、手肘疼痛（網球肘等）、跌打損傷

【用法、用量】 適量噴塗於患部，每日2~4次。

〈用法及用量注意事項〉

- (1) 15歲以下兒童請勿使用本產品。
- (2) 請嚴格遵守用法與用量。
- (3) 請注意避免藥液進入眼睛。萬一不慎進入眼睛，請立即以清水或溫水沖洗。
如症狀加劇，請前往眼科就診。
- (4) 請勿對臉部噴塗。
- (5) 請勿大面積或大量噴塗本產品。
- (6) 本品僅供外用，請勿吸入本產品。吸入本產品可能會導致頭暈、噁心、咳嗽、刺激鼻腔和喉嚨等症狀，
使用時請注意避免自己或他人吸入。
- (7) 請在充分搖勻後噴塗，噴塗時務必將噴嘴朝下（由於朝向上方或兩側噴塗時只有氣體會噴出，可能會導致殘餘藥液無法用完或藥液四處飛濺等問題）。
- (8) 噴塗時請與患部保持10cm的距離。
- (9) 請勿對同一部位持續噴塗3秒以上（可能會導致凍傷）。
- (10) 若需用於肩頸等部位，請先將藥液噴在手掌，然後再塗抹於患部。
- (11) 請勿以保鮮膜等透氣性差的物品包覆患部。



【成分、含量】

成分	含量（每100g原液中）
聯苯乙酸	3g
左旋薄荷醇	3g

添加物：乙醇、三乙醇胺、羧丙甲纖維素、聚氧乙烯氫化蓖麻油、二甲醚

保存方法及使用上的注意事項

- (1) 請確實蓋好瓶蓋後保存於陰涼乾燥處，避免陽光直射。
- (2) 請保存於兒童無法取得之處。
- (3) 請勿將本品放入其他容器（以免導致誤用或影響藥品品質）。
- (4) 使用時請注意避免讓本劑沾到衣物、家具、皮革製品及化學合成品等物品。否則可能會使物品變質或變色。
- (5) 請遠離火源。
- (6) 請勿在會產生火花的場所使用本產品。

《包裝》 80mL、120mL

【丟棄時的洩氣方法及注意事項】

〈洩氣注意事項〉

- 請務必在內容物全部使用完畢後，在遠離火源、通風良好的室外進行洩氣。
- 在洩氣過程中，因此請勿將臉部靠近本產品。殘留的藥液可能會連同氣體一起噴出。
- 除了瓶蓋以外，本產品其他部分均不可重複利用。
- 請注意避免直接吸入本產品噴出的氣體。

〈洩氣方法〉

※下圖為實際產品的說明書。樣品的構造與實際產品不同。

- ①按下「PUSH」標誌，即可拆下按鈕和肩蓋。
- ②將噴塗按鈕拔出。
- ③將蓋子上層摘除後，將蓋口朝下置於平面上。
- ④將瓶身上下顛倒過來，對準蓋子頂部中央的孔洞壓入瓶身，直到不再發出噴氣聲為止。
- ⑤待噴氣聲完全停止後，請按當地政府或地方法規丟棄。

