

缓解腰部及膝盖的难忍疼痛

フェイスZゲル

Feitas® Z Gel

添加1.0%双氯芬酸钠成分配合的凝胶擦剂

产品特点

- 有效成分为双氯芬酸钠，功效卓著，能缓解肩膀、颈部、腰部、关节和肌肉等部位的疼痛。
- 本产品基剂为酒精凝胶，清凉舒适、快乾且易于涂抹。
- 无异味，散发淡淡香气，不易引起注意，使用后可安心外出。

⚠ [使用注意事项]

❌ 禁止事项 [如果违反本项规定，可能会使症状恶化，或引发副作用。]

- 有以下情况者，请勿使用本产品。
 - (1) 曾因使用本产品或本产品成分而出现药物过敏等过敏反应者。
 - (2) 有气喘病者。
 - (3) 孕妇或可能已怀孕的女性。
 - (4) 15岁以下儿童。
- 请勿将本品用于下述部位。
 - (1) 眼睛周围、黏膜等。
 - (2) 皮肤较为脆弱的部位（脸部、头部、腋下等）。
 - (3) 湿疹、皮肤炎、伤口。
 - (4) 香港脚、金钱癣或化脓的患部。
- 使用本产品期间，请勿同时併用其他消炎镇痛外用药。
- 请勿长时间使用本产品。

用藥諮詢

- 有以下情况者，使用前请諮詢醫師意见，或洽詢藥劑師或零售藥房。
 - (1) 正在接受醫師治療者。
 - (2) 曾出現藥物過敏等過敏反應者。
 - (3) 正在使用下列醫藥品者。
新奎諾酮類抗菌劑
- 如使用後出現下列症狀，可能是本产品引發的副作用，請立刻停止使用，並持本包裝盒諮詢醫師意见，或洽詢藥劑師或零售藥房。

作用部位	症 狀
皮 膚	起疹發紅、瘙癢、皮膚炎、紅腫、皮膚粗糙、刺激感、色素沉澱、水泡、脫屑（表皮呈碎屑狀脫落）

本产品在極少數案例中會引發下列嚴重症狀。若出現下列症狀，請立即接受醫師治療。

症狀名稱	症 狀
休克 （過敏反應）	使用後立刻出現皮膚瘙癢、蕁麻疹、聲音嘶啞、打噴嚏、喉嚨發癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等症狀。
接觸性皮膚炎 光過敏症	塗抹部位出現伴隨著強烈瘙癢的起疹和發紅、紅腫、刺激感、水泡、潰瘍等嚴重皮膚炎症或色素沉澱、白斑，其中起疹發紅、發癢等症狀可能擴散至全身。被陽光照射過的部位也可能出現同樣的症狀、或發生惡化的情況。

- 使用5~6天後，如症狀仍未好轉，請停止使用，並持本說明書諮詢醫師意见，或洽詢藥劑師或零售藥房。

【功能、效果】腰痛、肌肉疼痛、伴隨肩頸僵硬的肩膀痠痛、關節疼痛、腱鞘炎（手掌、手腕疼痛）、手肘疼痛（網球肘等）、跌打損傷

【用法、用量】適量塗抹於患部，每日3~4次。請勿以保鮮膜等透氣性差的物品包覆患部。
同時請勿併用含本成分的外用藥。

〈用法及用量注意事項〉

- (1) 15歲以下兒童請勿使用本產品。
- (2) 請嚴格遵守用法與用量。
- (3) 本產品僅能緩解疼痛或浮腫，對造成疼痛或浮腫的病因並無療效，若無上述症狀，請勿使用本產品。
- (4) 請注意避免藥液進入眼睛。萬一不慎進入眼睛，請立即以清水或溫水沖洗。
如症狀加劇，請前往眼科就診。
- (5) 本產品僅供外用。
- (6) 每週用量請勿超過50g。
- (7) 請勿在同一患部併用其他外用藥。
- (8) 請勿以透氣性差的物品（保鮮膜、矯正帶等）包覆患部。
- (9) 使用後請立即洗手。

成分	含量（每1g）
雙氯芬酸鈉	10mg

添加物：己二酸二異丙酯、異丙醇、乳酸、羥乙基纖維素、羥丙甲纖維素、偏亞硫酸氫鈉。

保存方法及使用上的注意事項

- (1) 請保存於陰涼處，避免陽光直射。
- (2) 請保存於兒童無法取得之處。
- (3) 請勿將本品放入其他容器（以免導致誤用或影響藥品品質）。
- (4) 請遠離火源。
- (5) 如果使用期限已過，請勿使用。

嚴禁火氣
第二石油類 危險等級Ⅲ 異丙醇 水溶性

《包裝》 25g、50g