

缓解腰部及膝盖的难忍疼痛

フェイタス[®]Zクリーム 微香性

Feitas[®] Z Cream 淡香型

添加1.0%双氯芬酸钠

产品特点

- 本产品有效成分为双氯芬酸钠，功效卓著，能缓解肩膀、腰部和关节等部位的恼人疼痛。
- 乳霜质地滑顺不黏腻、易于涂抹，只需少许即可均匀涂布于患部。
- 散发淡淡香气，不引人注意、不干扰睡眠。
- 积层软管装，可将药剂彻底挤出、避免浪费。

⚠ [使用注意事项]

❌ 禁止事项 [如果违反本项规定，可能会使症状恶化，或引发副作用。]

- 有以下情况者，请勿使用本产品。
 - (1) 曾因使用本产品或本产品成分而出现药物过敏等过敏反应者。
 - (2) 有气喘病者。
 - (3) 孕婦或可能已懷孕的女性。
 - (4) 15歲以下兒童。
- 请勿将本品用于下述部位。
 - (1) 眼睛周围、黏膜等。
 - (2) 皮肤较为脆弱的部位（脸部、头部、腋下等）。
 - (3) 湿疹、皮炎、伤口。
 - (4) 香港脚、金钱癣或化脓的患部。
- 使用本产品期间，请勿同时併用其他消炎镇痛外用药。
- 请勿长时间使用本产品。



用藥諮詢

- 有以下情况者，使用前请咨询医师意见，或洽询药剂师或零售药房。
 - (1) 正在接受医师治疗者。
 - (2) 曾出现药物过敏等过敏反应者。
 - (3) 正在使用下列医药品者。新奎诺酮类抗菌剂
- 如使用后出现下列症状，可能是本产品引发的副作用，请立刻停止使用，并持本包装盒咨询医师意见，或洽询药剂师或零售药房。

作用部位	症 狀
皮 膚	起疹發紅、瘙癢、皮膚炎、紅腫、疼痛、刺激感、灼熱感、皮膚粗糙、脫屑（表皮呈碎屑狀脫落）、水泡、色素沉澱

本產品在極少數案例中會引發下列嚴重症狀。若出現下列症狀，請立即接受醫師治療。

症狀名稱	症 狀
休克 （過敏反應）	使用後立刻出現皮膚瘙癢、蕁麻疹、聲音嘶啞、打噴嚏、喉嚨發癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等症狀。
接觸性皮膚炎 光過敏症	塗抹部位出現伴隨著強烈瘙癢的起疹和發紅、紅腫、刺激感、水泡、潰瘍等嚴重皮膚炎症或色素沉澱、白斑，其中起疹發紅、發癢等症狀可能擴散至全身。被陽光照射過的部位也可能出現同樣的症狀、或發生惡化的情況。

- 使用5~6天後，如症狀仍未好轉，請停止使用，並持本說明書諮詢醫師意見，或洽詢藥劑師或零售藥房。

【功能、效果】腰痛、伴隨肩頸僵硬的肩膀痠痛、關節疼痛、肌肉疼痛、腱鞘炎（手掌、手腕疼痛）、手肘疼痛（網球肘等）、跌打損傷

【用法、用量】適量塗抹於患部，每日3~4次。請勿以保鮮膜等透氣性差的物品包覆患部。
同時請勿併用含本成分的外用藥。

〈用法及用量注意事項〉

- (1) 請嚴格遵守用法與用量。
- (2) 本產品僅供外用，請勿內服。
- (3) 每週用量請勿超過50g。
- (4) 請注意避免藥液進入眼睛。萬一不慎進入眼睛，請立即以清水或溫水沖洗。如症狀加劇，請前往眼科就診。
- (5) 請勿以保鮮膜等透氣性差的物品包覆患部。
- (6) 使用後請立即洗手。

【成分、含量】

成分	含量（每1g）
雙氯芬酸鈉	10mg

添加物：左旋薄荷醇、白凡士林、肉豆蔻酸異丙酯、角鯊烷、丙二醇、聚氧乙烯氫化蓖麻油、二丁基羥基甲苯、對羥基苯甲酸甲酯、對羥基苯甲酸丁酯、聚羧乙烯、pH調節劑、其他成分2種。

保存方法及使用上的注意事項

- (1) 請將蓋子旋緊並保存於陰涼處，避免陽光直射。
- (2) 請保存於兒童無法取得之處。
- (3) 請勿將本品放入其他容器（以免導致誤用或影響藥品品質）。
- (4) 如果使用期限已過，請勿使用。（使用期限印刷在紙盒及容器上）。為確保品質無虞，開封後請儘快使用，即使未超過使用期限，仍應儘快用畢。

《包裝》 30 g