

緩解肩部、頸部、腰部的強烈痛感

フェイス[®]Z_α ジクサス[®] ゲル

Feitas[®]Z_α Dicsas[®] Gel (微香型)

含雙氯芬酸鈉1.0%凝膠劑

商品の特點

- 有效成分雙氯芬酸鈉對緩解肩部、腰部、關節、肌肉的疼痛問題表現出良好效果。
- 本品採用了帶有清涼感的酒精凝膠基質，方便推開且迅速變乾。
- 微香型處方不會產生讓人不快的氣味，使用時無需擔心氣味對他人的影響。
- 乳白色凝膠觸感溫和，不刺激皮膚。

⚠ [使用上の注意事項]**❌ 禁止事項** [如不遵守，將會導致目前症狀惡化或易引起不良反應。]

1. 下列人群請勿使用。
 - (1) 對本品或本品成分有過敏史的人。
 - (2) 有哮喘病史的人。
 - (3) 孕婦或可能已懷孕的婦女。
 - (4) 不滿15歲的兒童。
2. 請勿用於以下部位。
 - (1) 眼周、黏膜等。
 - (2) 皮膚敏感脆弱的部位（面部、頭部、腋下等）
 - (3) 濕疹、接觸性皮膚炎、傷口。
 - (4) 足癬、皮癬等或化膿的患部。
3. 使用本品期間，請勿使用其他外用消炎鎮痛藥。
4. 請勿長期連續使用。

**諮詢事項**

1. 下列人群請在使用前諮詢醫生、藥劑師或註冊經銷商。
 - (1) 正在接受醫生治療的人。
 - (2) 有對藥物等過敏史的人。
 - (3) 正在使用下列藥品的人。
新喹諾酮類抗菌藥
2. 使用後出現下列症狀時，因為有可能是藥物副作用，所以請立即停止使用，並持本說明書諮詢醫生、藥劑師或註冊經銷商。

相關部位	症 狀
皮 膚	發疹與發紅、搔癢、接觸性皮膚炎、腫脹、疼痛、皮膚皸裂、刺激感、色素沈澱、水皰疹、皮膚掉屑（皮膚上有細屑脫落）

極少數患者會出現下列嚴重症狀。此時請立即接受醫生的診療。

症狀名稱	症 狀
休克 （過敏性反應）	使用後立即出現皮膚搔癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨發癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等症狀。
接觸性皮膚炎 光線過敏症	塗抹部出現伴有強烈搔癢的發疹與發紅、腫脹、刺激感、水皰、潰爛等劇烈的皮膚炎症狀及色素沈澱、白斑，其中發疹與發紅、搔癢等症狀有時會遍及全身。另外，暴露在陽光下的部位有時會出現症狀或症狀加重。

3. 若使用5～6天後症狀仍無好轉，請停止使用，並持本說明書諮詢醫生、藥劑師或註冊經銷商。

【功能、效果】腰痛、肌肉疼痛、伴隨肩酸的肩膀疼痛、關節痛、腱鞘炎（手、手腕疼痛）、手肘疼痛（網球肘等）、挫傷、扭傷

【用法、用量】每天3～4次，取適量塗抹於患部。但是，請勿用保鮮膜等透氣性較差的物品覆蓋於塗抹部位。此外，請勿同時使用含有本成分的其他外用藥劑。

〈用法與用量相關的注意事項〉

- （1）未滿15歲的兒童請勿使用本品。
- （2）請嚴格遵守規定的用法和用量。
- （3）本品不能治療引發疼痛和腫脹等症狀的疾病，而是治療疼痛和腫脹等症狀的藥劑，因此僅限於出現症狀時使用。
- （4）請注意不要濺入眼睛。萬一不慎入眼，請立即用清水或者溫水衝洗。此外，如果症狀嚴重，請接受眼科醫生的診療。
- （5）本品僅限外用。
- （6）1周使用量請勿超過50g。
- （7）使用本品的部位請勿同時使用其他外用藥劑。
- （8）請勿使用透氣性較差的物品（保鮮膜、矯正帶等）覆蓋使用本品的部位，不得讓患部處於密封狀態。
- （9）使用後請洗手。

成分	含量(膏體100g中)
雙氯芬酸鈉	1.0g
l-薄荷醇	4.5g
甘草次酸	0.05g
壬酸香蘭基醯胺	0.02g

添加劑中含有乙醇、二乙醇胺、疏水性羥丙甲纖維素、辣椒酊、BHT、羥丙基纖維素、丙二醇、脂肪醇聚氧乙烯醚及其他3種成分。

保管及使用注意事項

- （1）請保管在陰涼處，避免陽光直射。
- （2）請將本品放在兒童接觸不到的地方。
- （3）請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）。
- （4）請勿靠近火源。
- （5）請注意避免讓本品沾染到眼鏡、鐘錶、飾物等金屬類、化纖類衣物、塑料類產品、地板及家具塗層表面，否則存在導致物品變質或變色的風險。
- （6）本品過期後請勿使用。

嚴禁煙火

第二石油類 危險等級III 乙醇含有物 水溶性

【包裝】50g