

含殺菌+止癢成分及抗菌成分

ブテナロック[®]V_α クリーム

Butenalock[®]V_α Cream

專治香港腳、金錢癬 含鹽酸布蝶訥配方

產品特點

- 香港腳、金錢癬是毛癬菌屬的真菌寄生在皮膚表面角質層所引起的疾病。毛癬菌會侵蝕皮膚表面角質層等部位的角蛋白，並引發嚴重的瘙癢。
- Butenalock V_α乳霜是專治香港腳和金錢癬的藥品，能有效殺死引起香港腳的病菌（毛癬菌）。


添加強效殺菌成分「鹽酸布蝶訥」。能有效治療瘙癢難耐的香港腳！

- 能深入滲透角質層，有效殺死引起香港腳的病菌（毛癬菌）。
- 除止癢成分「馬來酸氯苯那敏」、「鹽酸待布卡因」、「克羅米通」外，另添加「左旋薄荷醇」，清涼舒適、緩解瘙癢。
- 含有殺菌成分「異丙基苯酚」。
- 含有抑制炎症成分「甘草次酸」。
- 能長效存留於皮膚，一日一次即可發揮療效。

Butenalock V_α【乳霜】適應症
(亦可用於其它症狀)

適用於腳趾間【浸潤型】
的香港腳（趾間型）

適用於腳底【角質增
厚型】的香港腳（角
化型）



⚠ [使用注意事項]

❌ 禁止事項 [如果違反本項規定，可能會使症狀惡化，或引發副作用。]

1. 有以下情況者，請勿使用本產品。
 - (1) 曾因使用本產品或本產品成分而出現藥物過敏等過敏反應者。
2. 請勿將本品用於下述部位。
 - (1) 眼睛及眼部周圍、黏膜（口腔、鼻腔、陰道等）、陰囊、外陰等。
 - (2) 濕疹。
 - (3) 患部浸潤、潰爛、龜裂或外傷嚴重者。



用藥諮詢

1. 有以下情況者，使用前請諮詢醫師意見，或洽詢藥劑師或零售藥房。
 - (1) 正在接受醫師治療者。
 - (2) 孕婦或可能已懷孕的女性。
 - (3) 嬰幼兒。
 - (4) 曾出現藥物過敏等過敏反應者。
 - (5) 患部面積較大或位於臉部者。
 - (6) 患部化膿者。
 - (7) 無法確定是「濕疹」還是「足癬、股癬、金錢癬」者。
(例陰囊出現瘙癢潰爛等症狀，原因通常濕疹等其他因素。)
2. 如使用後出現下列症狀，可能是本產品引發的副作用，請立刻停止使用，並持本包裝盒諮詢醫師意見，或洽詢藥劑師或零售藥房。

作用部位	症 狀
皮 膚	起疹發紅、瘙癢、皮膚炎、紅腫、刺激感、灼熱感、脫屑、潰爛、水泡、乾燥感、刺痛感、龜裂

3. 使用一週後，如症狀仍未好轉，請停止使用，並持本說明書諮詢醫師意見，或洽詢藥劑師或零售藥房。

【功能、效果】 香港腳、股癬、金錢癬

【用法、用量】 直接塗抹於患部，每天一次，每次適量。

〈用法及用量注意事項〉

- (1) 使用前請先清潔患部及周圍的皮膚。
- (2) 請注意避免藥液進入眼睛。萬一不慎進入眼睛，請立即以清水或溫水沖洗，並儘快前往眼科就醫。
- (3) 如需為兒童使用本產品，請務必在有監護人監督陪同的情況下使用。
- (4) 本產品僅供外用。

【成分、含量】

成分	含量 (每1g)	成分	含量 (每1g)
鹽酸布蝶啶	10mg	左旋薄荷醇	20mg
鹽酸待布卡因	2mg	克羅米通	10mg
馬來酸氯苯那敏	5mg	異丙基甲基酚	3mg
甘草次酸	2mg		


添加物：鯨蠟醇乙基己酸酯、二乙醇胺、自乳化型單硬脂酸甘油酯、聚二甲基矽氧烷、鯨蠟硬脂醇、對羟基苯甲酸酯、二丁基羥基甲苯、丙二醇、二十二烷醇、聚氧乙烯二十二基醚、肉豆蔻酸異丙酯

保存方法及使用上的注意事項

- (1) 請將蓋子旋緊並保存於陰涼處，避免陽光直射。
- (2) 請保存於兒童無法取得之處。
- (3) 請勿將本品放入其他容器（以免導致誤用或影響藥品品質）。
- (4) 如果使用期限已過，請勿使用。為確保品質無虞，開封後請儘快使用，即使未超過使用期限，仍應儘快用畢。


〈包裝〉 18g

【軟管口的開啟方法】



●請將蓋子反轉，以尖端抵住軟管前端並用力壓下。

治療香港腳的五大要點

<p>1 隨時注意避免讓雙腳處於潮濕悶熱的狀態下。 在15°C以上、濕度高於70%的環境下，容易滋生毛癬菌。 請注意隨時保持乾燥、避免悶熱潮濕。</p> 	<p>4 症狀消失後，仍應繼續塗抹香港腳藥品至少一個月以上。 即使症狀已經消失，仍有可能尚未徹底殺死毛癬菌，只是暫時抑制其活動而已。必須發揮耐心繼續擦藥，才能徹底根治。</p> 
<p>2 保持患部清潔 每天都要用肥皂仔細清洗。 本產品每日使用一次即可發揮療效，但患者需注意保持患處清潔，避免長時間的潮濕悶熱，且鞋襪需勤加換洗。</p> 	<p>5 如果家裡有其他香港腳患者，請一同接受治療。 如果家族成員中有人患有香港腳，很容易傳染給其他人。 若有感覺到異狀，請務必及早治療。</p> 
<p>3 用藥時薄塗即可，但不只是患部，還要擴及患處周圍。 毛癬菌實際的寄生範圍通常會大於出現症狀的患部，因此用藥時請加大塗抹的範圍。</p> 	<p>治療香港腳最重要的是全面性的日常足部護理。</p>